

## Parcours des femmes atteintes d'une endométriose ainsi que celui de leurs conjoint.e.s

UNE ENQUÊTE  
INÉDITE AUPRÈS  
D'UN ÉCHANTILLON  
EXCEPTIONNEL

→ **1 557\***

femmes atteintes  
d'endométriose



En France, l'endométriose assombrit la vie d'environ 1,5 à 2,5 millions de femmes en âge de procréer.

\*Panel IPSOS : 803 femmes  
EndoFrance : 754 femmes




**1<sup>ers</sup> symptômes**  
Âge moyen  
**24 ans**



Lorsque les femmes commencent à souffrir de leur endométriose, elles ressentent en moyenne **4,6 symptômes différents.**

**Règles très douloureuses**



**Autres symptômes fréquents :**

- Douleurs multiples du nombril au bas ventre : **66 %**
- Fatigue chronique : **54 %**
- Troubles digestifs : **52 %**
- Douleurs pendant les rapports sexuels : **50 %**
- Troubles urinaires : **25 %**



**1<sup>re</sup> Consultation**



**Les femmes témoignent de douleurs intenses soulagées à partir du moment où elles sont prises en charge**

**Avant le diagnostic,**  
l'intensité des douleurs de l'endométriose est évaluée en moyenne à


**7,8**



**Au moment de l'enquête, après diagnostic et prise en charge**

l'intensité des douleurs est évaluée en moyenne à

**4,1**



**L'endométriose assombrit le parcours de vie de la femme et du couple**



Près de **2 sur 3** se disent impactées par l'endométriose.


Dans leur vie sexuelle

Sur le plan psychologique

Sur le plan physique

Dans leur vie de couple ou leurs relations amoureuses

Dans leurs activités de loisirs




**7 ans**

**Diagnostic**  
Âge moyen  
**31 ans**

### Traitement de l'endométriose

Sur **1 179** femmes de 18 à 50 ans,

**55 %** reçoivent un traitement hormonal.



**26 %**  
Pilule estro-progestative



**17 %**  
Progestatif



**9 %**  
Produit induisant une ménopause artificielle



**8 %**  
Stérilet hormonal

En moyenne, les femmes ont changé **3,8** fois de traitement pour leur endométriose

### Sur le plan professionnel



Impact négatif sur le **bien-être au travail** pour plus de **1 femme sur 2**



Impact sur les capacités physiques et intellectuelles pour travailler

### Conséquences possibles sur les projets d'enfants



**Les difficultés pour être enceintes**

concernent plus d'**1 femme sur 2** atteintes d'endométriose.

**33 %**

Environ un tiers des femmes souffrant d'endométriose ont recours à la procréation médicalement assistée pour concevoir un enfant.

**52 %** des femmes ayant eu recours à l'AMP\* ont réussi à être enceinte

\* Assistance médicale à la procréation



**La sexualité du couple est le domaine le plus perturbé par la maladie**



Près de **7 femmes sur 10** ressentent une **diminution du désir et de la libido.**



Près de **6 femmes sur 10** s'abstiennent de **rapports sexuels** pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois.

Ces conséquences de la maladie sur la sexualité sont encore plus fréquentes chez les femmes qui souffrent d'endométriose profonde avec atteintes digestives.

En parallèle, les réponses des conjoints confirment qu'un quart d'entre eux ont souvent renoncé à avoir une relation sexuelle avec leur partenaire.